

附件 2

“国家药品目录”新增乙类药品（含部分限定支付范围调整药品）自理比例

序号	药品名称	医保支付范围	自理比例
1	全氟己基辛烷滴眼液	限睑板腺功能障碍相关干眼。	30%
2	鱼油(3%)橄榄油中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(13%)注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。	30%
3	雌二醇地屈孕酮片		30%
4	斯泰度塔单抗注射液	限成人破伤风紧急预防。	30%
5	安瑞克芬注射液	限腹部手术后的轻、中度疼痛。	30%
6	布西珠单抗注射液	限糖尿病黄斑水肿(DME)。 应同时符合以下条件：1.需三级医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方； 2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5；3.事前审查后方可使用，初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像证据)；4.每眼累计最多支付9支，第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗、布西珠单抗的药品支数合并计算。	25%
7	替妥尤单抗 N01 注射液	限中重度甲状腺眼病。	25%
8	锝[99mTc]替曲膦注射液		30%
9	玛舒拉沙韦片	限既往健康的12岁及以上青少年和成人单纯性甲型和乙型流感患者的治疗，不包括存在流感相关并发症高风险的患者。	30%
10	昂拉地韦片	限成人单纯型甲型流感患者的治疗，不包括存在流感相关并发症高风险的患者。	30%
11	普托马尼片	限耐多药结核患者。	25%
12	甲磺酸普雷福韦片	限慢性乙型肝炎成人患者。	30%
13	恩曲利匹丙诺片	限艾滋病病毒感染。	25%
14	醋酸来法莫林注射用浓溶液	限成人社区获得性肺炎。	30%
15	醋酸来法莫林片	限成人社区获得性肺炎。	30%
16	注射用亚胺培南西司他丁钠/氯化钠注射液	限头孢菌素耐药或重症感染患者。	30%
17	注射用美罗培南/氯化钠注射液		30%
18	盐酸万古霉素胶囊		30%
19	注射用氨曲南阿维巴坦钠	限18岁及以上患者由敏感革兰阴性菌引起的治疗药物选择有限或无替代治疗的下列感染：1.复杂性腹腔感染(cIAI)；2.医院获得性肺炎(HAP)，包括呼吸机相关性肺炎(VAP)。	30%
20	盐酸替那帕诺片	限对磷结合剂疗效不充分或不耐受的慢性肾脏病(CKD)成人透析患者。	30%
21	依伏卡塞片	限维持性透析患者的继发性甲状旁腺功能亢进症。	30%
22	戊二酸利那拉生酯胶囊	限反流性食管炎。	30%
23	怡培生长激素注射液	限3岁及以上儿童的生长激素缺乏症所致的生长缓慢。	100%，儿童30%
24	瑞格列汀二甲双胍片(I)		30%

25	瑞格列汀二甲双胍片(II)		30%
26	依苏帕格鲁肽 α 注射液	限成人2型糖尿病患者的血糖控制。	30%
27	金培生长激素注射液	限内源性生长激素缺乏(GHD)所引起的儿童生长缓慢。	100%，儿童30%
28	多替诺雷片	限痛风伴高尿酸血症患者。	30%
29	替尔泊肽注射液	限成人2型糖尿病患者的血糖控制：在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。	30%
30	棕榈酸帕利哌酮注射液(II)		30%
31	奥氮平氯西汀胶囊		30%
32	注射用阿立哌唑微球		30%
33	氨碘必利口崩片		30%
34	舒马普坦萘普生钠片	限成人有或无先兆偏头痛的急性发作的治疗。	30%
35	注射用替奈普酶	限脑梗死发病4.5小时内的溶栓治疗。	30%
36	注射用阿格司亭 α	限既往化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。	30%
37	本瑞利珠单抗注射液	限成人和12岁及以上青少年重度嗜酸粒细胞性哮喘(SEA)的维持治疗。	25%
38	阿地溴铵吸入粉雾剂		30%
39	盐酸胍法辛缓释片	限6岁及6岁以上注意缺陷多动障碍(ADHD)。	30%
40	盐酸右哌甲酯缓释胶囊	限6岁及6岁以上注意缺陷多动障碍(ADHD)。	30%
41	奥瑞利珠单抗注射液	限：1.成人复发型多发性硬化；2.成人原发进展型多发性硬化。	25%
42	磷苯妥英钠注射用浓溶液	限：1.全身性强直-阵挛性癫痫持续状态；2.当患者无法口服苯妥英钠时，可用于短期替代治疗。	30%
43	沙库巴曲阿利沙坦钙片	限原发性高血压。	30%
44	英克司兰钠注射液	限成人原发性高胆固醇血症(杂合子型家族性和非家族性)或混合型血脂异常患者以下情况方予支付：1.接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者；2.他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者。	30%
45	阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片		30%
46	伊努西单抗注射液	限接受中等剂量或中等以上剂量他汀类药物治疗后，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)目标的原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症)和混合型血脂异常的成人患者。	30%
47	注射用瑞卡西单抗	限接受中等或以上剂量他汀类药物治疗，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)目标的原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症)和混合型血脂异常的成人患者；或单药用于非家族性高胆固醇血症和混合型血脂异常的成人患者。	30%
48	昂戈瑞西单抗注射液	限接受中等或以上剂量他汀类药物治疗，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)目标的原发性高胆固醇血症(包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症)和混合型血脂异常的成人患者；或在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独或与依折麦布联合用药用于非家族性高胆固醇血症和混合型血脂异常的成人患者。	30%
49	盐酸拉贝洛尔氯化钠注射液	适用于严重高血压。	30%
50	夫那奇珠单抗注射液	限：1.适合接受系统治疗或光疗的中重度斑块状银屑病的成人患者；2.常规治疗疗效欠佳的活动性强直性脊柱炎的成人患者。	25%
51	赛立奇单抗注射液	限：1.适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病成人患者；2.常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎(放射学阳性中轴型脊柱关节炎)成人患者。	25%
52	依若奇单抗注射液	限对环孢素、甲氨蝶呤(MTX)等其他系统性治疗或PUVA(补骨脂素和紫外线A)不应答、有禁忌或无法耐受的中度至重度斑块状银屑病的成年患者。	25%
53	硫酸艾玛昔替尼片	限：1.对局部外用治疗或其他系统性治疗应答不充分或不耐受的中重度特应性皮炎成人患者；2.对一种或多种TNF抑制剂疗效不佳或不耐受的中重度活动性类风湿关节炎成人患者；3.对一种或多种TNF抑制剂疗效不佳或不耐受的活动性强直性脊柱炎成人患者。	25%

54	司普奇拜单抗注射液	限: 1.外用药控制不佳或不适合外用药治疗的成人中重度特应性皮炎患者; 2.糖皮质激素治疗和/或手术治疗控制不佳的慢性鼻窦炎伴鼻息肉成人患者, 在鼻用糖皮质激素治疗基础之上使用; 3.鼻用糖皮质激素联合抗组胺药物治疗后症状控制不佳的成人中重度季节性过敏性鼻炎患者。	25%
55	利生奇珠单抗注射液	限对传统治疗或生物制剂治疗应答不足、失应答或不耐受的中重度活动性克罗恩病成年患者。	25%
56	吉塞奇尤单抗注射液(静脉输注)	限: 1.对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性克罗恩病成人患者的诱导治疗; 2.对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者的诱导治疗。	25%
57	利生奇珠单抗注射液(皮下注射)	限对传统治疗或生物制剂治疗应答不足、失应答或不耐受的中重度活动性克罗恩病成年患者。	25%
58	盐酸吉卡昔替尼片	限中危或高危原发性骨髓纤维化(PMF)、真性红细胞增多症继发性骨髓纤维化(PPV-MF)和原发性血小板增多症继发性骨髓纤维化(PET-MF)的成人患者。	25%
59	艾伏尼布片	限诊断为携带易感异柠檬酸脱氢酶-1(IDH1)突变的复发性或难治性急性髓系白血病(AML)成人患者。	25%
60	马来酸阿可替尼片	限: 1.慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)成人患者; 2.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。	25%
61	匹妥布替尼片	限既往接受过至少两种系统性治疗(含布鲁顿氏酪氨酸激酶[BTK]抑制剂)的复发或难治性套细胞淋巴瘤(MCL)成人患者。	25%
62	注射用磷罗拉匹坦帕洛诺司琼	限预防成人高度致吐性化疗(HEC)引起的急性和迟发性恶心和呕吐。	30%
63	注射用培妥罗凝血素α	限: 1.儿童甲(A)型血友病; 2.成人甲(A)型血友病限出血时使用。	25%
64	去铁酮片	限地中海贫血。	25%
65	艾沙妥昔单抗注射液	限: 1.不适合自体干细胞移植(ASCT)的新诊断的多发性骨髓瘤成人患者; 2.既往接受过至少一线治疗(包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂)的多发性骨髓瘤成人患者。	25%
66	注射用重组人凝血因子VIIa N01	限凝血因子VIII或IX的抑制物>5个 Bethesda 单位(BU)的成人及青少年(12岁以上)先天性血友病患者。	25%
67	格菲妥单抗注射液	限: 1.既往接受过至少两线系统性治疗的复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)成人患者; 2.不适合自体造血干细胞移植(ASCT)的复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤非特指型(DLBCL NOS)成人患者。	25%
68	利厄替尼片	限: 1.具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子 19 缺失或外显子 21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗; 2.既往经 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展, 并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性 NSCLC 成人患者。	25%
69	盐酸佐利替尼片	限具有表皮生长因子受体(EGFR)19 号外显子缺失或外显子 21(L858R)置换突变, 并伴中枢神经系统(CNS)转移的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗。	25%
70	塞纳帕利胶囊	限晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。	25%
71	普拉替尼胶囊	限: 1.转染重排(RET)基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者; 2.需要系统性治疗的晚期或转移性 RET 突变型甲状腺髓样癌(MTC)成人和 12 岁及以上儿童患者; 3.需要系统性治疗且放射性碘难治的晚期或转移性 RET 融合阳性甲状腺癌成人和 12 岁及以上儿童患者。	25%
72	塞普替尼胶囊	限: 1.转染重排(RET)基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者; 2.需要系统性治疗的晚期或转移性 RET 突变型甲状腺髓样癌(MTC)成人和 12 岁及以上儿童患者; 3.需要系统性治疗且放射性碘难治的晚期或转移性 RET 融合阳性甲状腺	25%

		癌成人和 12 岁及以上儿童患者。	
73	已二酸他雷替尼胶囊	限 ROS1 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	25%
74	尼拉帕利阿比特龙片	限携带胚系和/或体系 BRCA 基因突变的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者(mCRPC)。	25%
75	菲诺利单抗注射液	限: 1.复发性和/或转移性头颈部鳞状细胞癌的一线治疗; 2.联合贝伐珠单抗用于既往未接受过系统治疗的不可切除或转移性肝细胞癌的患者。	25%
76	塔戈利单抗注射液	限: 1.既往接受过二线及以上化疗失败的复发或转移性鼻咽癌患者的治疗; 2.复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗。	25%
77	艾帕洛利托沃瑞利单抗注射液	限既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者。	25%
78	注射用苏维西塔单抗	限铂耐药后接受过不超过 1 种系统治疗的成人复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的治疗。	25%
79	派安普利单抗注射液	限: 1.至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤成人患者; 2.局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗; 3.既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌成人患者; 4.复发或转移性鼻咽癌的一线治疗。	25%
80	注射用芦康沙妥珠单抗	限: 1.既往至少接受过 2 种系统治疗(其中至少 1 种治疗针对晚期或转移性阶段)的不可切除的局部晚期或转移性三阴性乳腺癌成人患者; 2.经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)和含铂化疗治疗后进展的 EGFR 基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	25%
81	吡洛西利片	限: 1.与氟维司群联合用于既往接受内分泌治疗后出现疾病进展的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性晚期或转移性乳腺癌成人患者; 2.既往转移性阶段接受过两种及以上内分泌治疗和一种化疗后出现疾病进展的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性晚期或转移性乳腺癌成人患者。	25%
82	注射用瑞康曲妥珠单抗	限存在 HER2(ERBB2)激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	25%
83	枸橼酸伏维西利胶囊	限联合氟维司群用于既往接受内分泌治疗后出现疾病进展的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性的复发或转移性成年乳腺癌患者。	25%
84	恩替司他片	限联合芳香化酶抑制剂用于治疗激素受体(HR)阳性、人类表皮生长因子受体-2(HER-2)阴性, 经内分泌治疗复发或进展的局部晚期或转移性乳腺癌患者。	25%
85	盐酸来罗西利片	限: 1.与芳香化酶抑制剂联合使用作为初始内分泌治疗的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性(HR+/HER2-)局部晚期或转移性乳腺癌成人患者; 2.与氟维司群联合用于既往接受内分泌治疗后疾病进展的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性(HR+/HER2-)局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。	25%
86	醋酸甲地孕酮口服混悬液	限: 1.获得性免疫缺陷综合征患者的厌食症; 2.获得性免疫缺陷综合征患者及癌症患者恶病质引起的体重明显减轻。	30%
87	紫杉醇口服溶液	限一线含氟尿嘧啶类方案治疗期间或治疗后出现疾病进展的晚期胃癌患者。	25%
88	盐酸伊立替康脂质体注射液(II)	限既往经吉西他滨为基础的化疗治疗失败的不可切除的局部晚期或转移性胰腺癌患者的治疗。	25%
89	西妥昔单抗 N01 注射液	限与 FOLFOX 或 FOLFIRI 方案联合用于一线治疗 RAS 基因野生型的转移性结直肠癌。	25%
90	醋酸阿比特龙片(II)		25%
91	氘恩扎鲁胺软胶囊	限接受醋酸阿比特龙及化疗后出现疾病进展, 且既往未接受新型雄激素受体抑制剂的转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)成人患者。	25%
92	氟泽雷塞片	限至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因	25%

		(KRAS)G12C 突变型的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	
93	卡匹色替片	限联合氟维司群用于转移性阶段至少接受过一种内分泌治疗后疾病进展，或在辅助治疗期间或完成辅助治疗后 12 个月内复发的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性且伴有一种或多种 PIK3CA/AKT1/PTEN 改变的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。	25%
94	伊那利塞片	限联合哌柏西利和氟维司群，用于内分泌治疗耐药(包括在辅助内分泌治疗期间或之后出现复发)、PIK3CA 突变、激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。	25%
95	枸橼酸戈来雷塞片	限至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C 突变型的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	25%
96	苹果酸法米替尼胶囊	限联合注射用卡瑞利珠单抗用于既往接受含铂化疗治疗失败但未接受过贝伐珠单抗治疗的复发或转移性宫颈癌患者。	25%
97	格索雷塞片	限至少接受过一种系统性治疗的鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)G12C 突变型的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	25%
98	芦沃美替尼片	限：1.2 岁及 2 岁以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤(PN)的 I 型神经纤维瘤病(NF1)儿童及青少年患者；2.朗格汉斯细胞组织细胞增生症(LCH)和组织细胞肿瘤成人患者。	25%
99	复方比那甫西颗粒		30%
100	芪防鼻通片	益气通窍。用于改善肺脾两虚型持续性变应性鼻炎未合并季节性过敏原者的喷嚏、流涕、鼻痒、鼻塞，舌淡，苔白，脉浮或脉细弱。	30%
101	温阳解毒颗粒	温阳益气，化湿解毒。用于疫病辨证属阳气虚弱，疫毒侵袭，症见发热、咳嗽、胸闷、四肢不温、气短乏力、大便溏薄；舌淡，苔少或白苔，脉沉细或弱。	30%
102	玉女煎颗粒	清胃热，滋肾阴。用于胃热阴虚证。症见头痛，牙痛，齿松牙衄，烦热干渴，或消渴，消谷善饥，舌红苔黄而干，脉浮洪或滑。	30%
103	参郁宁神片	益气养阴、宁神解郁。用于轻、中度抑郁症中医辨证属气阴两虚证者，症见失眠多梦、多疑善惊、口咽干燥，舌淡红或红、苔薄白少津、脉细或沉细等。	30%
104	养血祛风止痛颗粒	补气养血，散风止痛。用于频发性紧张型头痛中医辨证属气血两虚证，症见头痛反复发作、头脑昏沉，以及食少纳呆、自汗、气短、神疲乏力、面色苍白，舌淡苔白、脉沉细而弱等。	30%
105	益气清肺颗粒	益气养阴，健脾和中，清热祛湿。适用于疫病后短期症状，气阴两虚，脾虚失运，余邪未尽证，症见倦怠乏力、动后气短、干咳少痰、咽喉不利、胃脘痞闷、纳呆便溏，舌淡或红、少津，脉细数。	30%
106	羟考酮纳洛酮缓释片	限成人需阿片类镇痛药才能充分控制的重度疼痛。	30%
107	注射用盐酸头孢吡肟/氯化钠注射液		30%
108	呋塞米口服溶液		30%
109	醋酸氟氢可的松片	限失盐型先天性肾上腺皮质增生症(CAH)及失盐型原发慢性肾上腺皮质功能减退症(Addison 病)。	30%
110	熊去氧胆酸口服混悬液	限：1.胆囊胆固醇结石(必须是 X 射线能穿透的结石，同时胆囊收缩功能须正常)；2.胆汁淤积性肝病(如：原发性胆汁性肝硬化)；3.胆汁反流性胃炎；4.1 月龄至 18 岁患者的囊性纤维化相关肝病。	30%
111	吡仑帕奈口服混悬液	限成人和 4 岁及以上儿童癫痫部分性发作患者的治疗。	30%
112	盐酸伊立替康脂质体注射液	限接受吉西他滨治疗后进展的转移性胰腺癌患者。	30%
113	葡萄糖酸钙氯化钠注射液		30%
114	帕拉米韦注射液		30%
115	复方聚乙二醇(3350)电解质散		30%